


Aktuelle Sortimentsliste (Stand: 17.04.2025)
Wildblumen GmbH, Rebstein



Legende:

Die grau markierten Wildstauden sind momentan nicht lieferbar.

Hinweis:

Unsere Farne stammen nicht aus der Schweiz und aus konventioneller Produktion.

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|--|-------|-------|----------|
| A | | | | | | | | |
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe; Gemeine Schafgarbe | weiss | 6-10 | 30-60 | Wiese | ○ | 6.90 | SG |
| Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe; Wilder Bertram | weiss | 7-9 | 30-80 | Wechselfeucht | ○ | 6.90 | SG |
| Acinos alpinus | Alpen-Steinquendel | violett | 5-10 | 15-20 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | violett | 5-10 | 40-150 | Ruderal; Gehölzrand | ● | 7.90 | LU |
| Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut | hellgelb | 6-8 | 60-120 | Gehölzrand | ●● | 7.90 | LU |
| Actaea spicata | Christophskraut | weiss | 4-7 | 40-80 | Gehölzrand | ● | 7.90 | |
| Agastache foeniculum | Anis-Duftnessel | violett | 7-8 | 60-150 | Gewürzpflanze | ●● | 7.90 | BE |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | gelb | 7-9 | 50-80 | Ruderal; Wiese; Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Agrimonia procera | Wohlrüchender Odermennig | gelb | 6-9 | 60-100 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Ajuga genevensis | Genfer Günsel | blau | 4-6 | 15-20 | Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Ajuga reptans | Kriechender Günsel | blau; rosa | 4-6; 9 | 10-30 | Wiese fett; Gehölzrand | ● | 6.90 | SG |
| Alcea rosea "Nigra" | Schwarze Malve; Stockrose | schwarz | 7-10 | 130-180 | Gewürzpflanze (Tee) | ○ | 6.90 | TG |
| Alchemilla alpina | Alpenfrauenmantel | gelblich | 6-7 | 10-30 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel | gelblich | 4-5; 8 | 20-40 | Wiese fett | ○● | 6.90 | LU |
| Allium carinatum | Gekielter Lauch | dunkelrosa | 7-8 | 30-60 | Wiese mager; Ruderal; Gehölzrand | ○● | 6.90 | TG |
| Allium cepa var. viviparum | Luftzwiebel; Etagenzwiebel | grünlich | | 30-60 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | |
| Allium fistulosum | Winterzwiebel | cremeweiss | 6-8 | 50-80 | Ruderal fett | ○● | 7.90 | SG |
| Allium lusitanicum | Berg-Lauch | dunkelrosa | 7-9 | 15-30 | Wiese mager; Ruderal | ○● | 6.90 | TG |
| Allium schoenoprasum | Schnittlauch | dunkelrosa | 5-8 | 20-40 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | TG |
| Allium sphaerocephalon | Kugel-Lauch; Kugelköpfiger Lauch | purpur | 7 | 50-70 | Ruderal | ○ | 6.90 | LU |
| Allium tuberosum | Schnittknoblauch | weiss | 8-10 | 40-60 | ruderal-humos | ○● | 6.90 | |
| Allium vineale | Weinberg-Lauch | lila | 7 | 40-70 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Allium x proliferum | Etagen-Zwiebel | weiss | 6-8 | 50-80 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | |
| Aloysia triphylla | Zitronen-Verbene | weiss | 6-8 | 80-150 | Gewürzpflanze | ●● | 6.90 | SG |
| Althea officinalis | Echter Eibisch | blassrosa | 6-9 | 60-120 | Ruderal fett | ○● | 7.90 | SG |
| Alyssum montanum | Berg-Steinkraut | goldgelb | 4-5 | 10-20 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |
| Anchusa officinalis | Echte Ochsenzunge | hellblau | 5-8 | 50-100 | Ruderal fett | ○ | 6.90 | SG |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | weiss | 3-4 | 10-20 | Gehölzrand | ○●● | 6.90 | TG |
| Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | gelb | 4 | 10-20 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | TG |
| Anemone sylvestris | Wald-Windröschen; Grosses Windröschen | weiss | 4-5; 9 | 30-50 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | TG |
| Angelica archangelica | Echte Engelwurz | grünlich | 7-9 | 80-150 | Gehölzrand | ○● | 7.90 | SG |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz; Wilde Brustwurz | weiss | 7-10 | 80-150 | Gehölzrand | ○●● | 7.90 | SG |
| Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | gelb | 6-9 | 40-60 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG/BE |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------|---------|--|-------|-------|----------|
| Anthericum liliago | Astlose Graslilie | weiss | 5-6 | 40-60 | Wiese mager | ○ | 7.90 | LU |
| Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | weiss | 6-9 | 40-70 | Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand | ○● | 7.90 | SG |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | weiss | 4-5 | 60-120 | Wiese fett | ○ | 6.90 | SG |
| Anthyllis vulneraria s. str. | Gewöhnlicher Wundklee | gelb | 4-9 | 15-30 | Wiese mager | ○ | 6.90 | DG |
| Aquilegia atrata | Dunkle Akelei | rotviolett | 5-6 | 50-70 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | LU |
| Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | blauviolett | 5-6 | 50-90 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | BE |
| Arctium lappa | Grosse Klette | rotviolett | 7-9 | 150-200 | Ruderal | ○● | 7.90 | SG |
| Arctium minus | Kleine Klette | violett | 7-9 | 50-80 | Ruderal | ○● | 7.90 | |
| Arctium tomentosum | Filz-Klette | lila | 7-9 | 60-120 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Aristolochia clematitis | Osterluzei | gelb | 5-8 | 30-40 | Ruderal | ○● | 9.10 | |
| Armoracia rusticana | Meerrettich | weiss | 5 | 40-120 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | SG |
| Artemisia abrotanum | Eberreis | gelb | 7-10 | 40-120 | Gewürzpflanze | ○ | 7.90 | SG |
| Artemisia abrotanum v. citrata | Zitronen Eberreis | grün | 6-9 | 70-90 | Gewürzpflanze | ○ | 7.90 | TG |
| Artemisia absinthium | Echter Wermut | gelblich | 7-8 | 40-80 | Ruderal; Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | SG |
| Artemisia dracunculoides | Estragon | gelblich | 8-9 | 60-120 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | TG |
| Artemisia ludoviciana | Silbriger-Beifuss | gelb | 7-9 | 50-70 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | SG |
| Artemisia procera | Wohlfriechende Eberraute | gelb | 8-9 | 80-100 | Trocken | ○ | 6.90 | SG |
| Artemisia vulgaris | Gemeiner Beifuss | gelb-bräunlich | 7-8 | 80-150 | Ruderal fett | ○● | 6.90 | |
| Arum maculatum | Gemeiner Aronstab | grünlich | 4-5 | 15-30 | Gehölzrand | ●● | 8.10 | SG |
| Aruncus dioicus | Wald-Geissbart | weisslich | 7-9 | 100-180 | Gehölzrand | ●● | 7.90 | BE |
| Asarum europaeum | Haselwurz | rotbraun | 7-10 | 5-10 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | |
| Asperula cynanchica | Hügel-Waldmeister | hellrosa | 7-11 | 10-30 | Wiese mager | ○ | 6.90 | TG |
| Aster amellus | Berg-Aster; Kalk-Aster | lila | 7-10 | 30-60 | Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Aster linosyris | Gold-Aster; Goldschopf-Aster | gelb | 7-10 | 40-70 | Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand | ○ | 7.90 | TG |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote; Süsser Tragant | gelblich | 6-8 | 30-150 | Gehölzrand | ○● | 7.90 | BE |
| Astrantia major | Grosse Sterndolde | weiss; rötlich | 5-10 | 50-80 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Atropa bella-donna | Tollkirsche | braunviolett | 6-7 | 80-200 | Gehölzrand | ●● | 7.90 | BE |
| B | | | | | | | | |
| Barbarea vulgaris | Gemeine Winterkresse | gelb | 5-7 | 30-90 | Ruderal fett; Wegränder | ○● | 6.90 | BE |
| Ballota nigra | Schwarznessel | rosa | 7-9 | 50-80 | Ruderal fett | ○● | 6.90 | BE |
| Borago officinalis | Borretsch | himmelblau | 5-8 | 20-70 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | |
| Bryonia dioica | Zweihäusige Zaunrübe | weiss | 6-7 | bis 400 | Gehölzrand | ○● | 7.90 | |
| Buglossoides purpurocaerulea | Blauer Steinsame | rot; violett; blau | 5-6 | 20-60 | Gehölzrand | ○●● | 6.90 | |
| Bupththalmum salicifolium | Weidenblättriges Rindsauge | gelb | 6-9 | 40-70 | Wiese mager; Ruderal mager; Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Bupleurum falcatum | Sichelblättriges Hasenohr | gelb | 7-10 | 30-80 | Wiese; Ruderal mager; Gehölzrand | ○● | 7.90 | LU |
| Bupleurum longifolium | Langblättriges Hasenohr | rötlich-gelb bis braunrot | 6-8 | 30-80 | Gehölzrand | ○● | 7.90 | |
| C | | | | | | | | |
| Calamintha menthifolia | Wald-Bergminze | lila | 7-10 | 40-60 | Wiese; Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Campanula cochleariifolia | Niedliche Glockenblume | hellblau | 6-8 | 5-15 | Ruderal mager | ○●● | 6.90 | SG |
| Campanula glomerata | Knäuel-Glückenblume; Büschel- Glockenblume | blauviolett | 5-6; 8 | 20-60 | Ruderal mager; Wiese | ○● | 6.90 | SG |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|---------|---------------------------------|-------|---------|----------|
| Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenblume | blauviolett | 5-6 | 80-120 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | hellblau | 6-8 | 40-80 | Wiese | ○● | 6.90 | SG |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | hellblau; weiss | 6-7 | 50-100 | Gehölzrand; Wiese | ○● | 6.90 | SG |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | violettblau | 6-9 | 50-90 | Ruderal; Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | hellblau | 5-8 | 40-80 | Wiese; Ruderal; Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | violettblau | 5-10 | 10-30 | Wiese mager; Ruderal mager | ○● | 6.90 | SG/BE |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | violettblau | 6-10 | 50-100 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | helllila | 4 | 20-50 | Wiese fett | ○ | 6.90 | |
| Carduus nutans | Nickende Distel | purpur | 5-6 | 60-100 | Ruderal fett | ○ | 6.90 | LU |
| Carlina acaulis | Gewöhnliche Silberdistel | silberweiss | 7-9 | 5-20 | Ruderal | ○ | 6.90 | |
| Carlina vulgaris | Gewöhnliche Golddistel | strohgelb | 7-9 | 20-50 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Carum carvi | Kümmel | weiss | 5-8 | 30-60 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | SG |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | hellpurpur | 5-7; 9-10 | 50-80 | Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | SG |
| Centaurea montana | Berg-Flockenblume | blau | 4-10 | 30-50 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume | rosa | 7-9 | 50-120 | trocken, ruderal, humos | ○ | 6.90 | |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | purpur | 5-9 | 60-100 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Centaureum erythraea | Echtes Tausendgüldenkraut | rosa | 7-9 | 10-30 | Wiese mager/fett; Ruderal | ○● | 6.90 | SG |
| Cephalaria alpina | Alpen-Schuppenkopf | gelb | 6-8 | 80-180 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | Lu |
| Chaerophyllum hirsutum | Gebirgs-Kälberkopf | weiss; rosa | 4-5 | 50-100 | Wiese | ● | 6.90 | SG |
| Chelidonium majus | Schöllkraut; Warzenkraut | gelb | 4-9 | 30-70 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Chenopodium bonus-henricus | Guter Heinrich | bräunlich | 6-8 | 40-80 | Ruderal | ○ | 6.90 | LU |
| Cichorium intybus | Wegwarte | hellblau | 6-10 | 60-150 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Cirsium eriophorum | Wollköpfige Kratzdistel | purpur | 7-8 | 70-150 | Ruderal | ○ | 7.90 | TG |
| Cirsium oleraceum | Kohldistel | hellgelb | 6-10 | 80-150 | Wiese feucht | ○● | 6.90 | TG |
| Cirsium rivulare | Bach-Kratzdistel | purpurrot | 6-8 | 50-150 | Wiese feucht | ○● | 6.90 | |
| Clematis alpina | Alpen-Waldrebe | blau | 5 | bis 300 | Gehölzrand | ● | ab 6.90 | SG |
| Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | weiss | 6-8 | bis 800 | Gehölzrand | ● | ab 6.90 | TG |
| Clinopodium vulgare | Wirbeldost | hellpurpur | 7-10 | 30-60 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Colchicum autumnale | Herbstzeitlose | lila-rosa | 8-10 | 5-25 | Zwiebelpflanze; Fettwiese | ○● | 9.00 | SG |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | weiss | 5 | 10-20 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | TG |
| Corydalis cava | Hohlknolliger Lerchensporn | purpur, weiss | 3-4 | 15-30 | Gehölzrand | ●● | 8.10 | SG/D |
| Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | gelb | 4-11 | 10-40 | Ruderal | ○● | 6.90 | |
| Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | lila | 4-11 | 5 | Ruderal | ○●● | 6.90 | SG |
| Cynara scolymus | Artischocke | violett | 7-8 | bis 200 | Gemüse | ○ | ab 7.90 | |
| Cynoglossum officinale | Echte Hundszunge | braunrot | 5-6 | 40-90 | Ruderal | ○● | 6.90 | SG |
| D | | | | | | | | |
| Daucus carota | Wilde Möhre | weiss | 6-9 | 50-100 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Dianthus armeria | Raue Nelke | purpur | 6-8 | 30-60 | Ruderal | ○● | 6.90 | |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|-------------------------|--|-----------------|------------|---------|-----------------------------|-------|-------|----------|
| Dianthus carthusianorum | Kartäuser-Nelke | purpur | 5-9 | 30-60 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Dianthus deltoides | Heide-Nelke | purpur | 5-6 | 10-20 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | BE |
| Dianthus superbus | Pracht-Nelke | lila; weiss | 6-9 | 30-60 | Wiese wechselfeucht | ○● | 6.90 | SG |
| Dianthus sylvestris | Stein-Nelke | rosa | 7-11 | 30-60 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Dictamnus albus | Diptam | rosa; weiss | 5-6 | 60-120 | Gehölzrand | ○● | ab 21 | TG |
| Digitalis grandiflora | Grossblütiger Fingerhut | gelb | 6-8 | 50-100 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | hellgelb | 6-8 | 50-100 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | purpur | 6-9 | 40-100 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | BE |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde | lila | 7-8 | 100-200 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Dipsacus laciniatus | Schlitzblättrige Karde | weiss | 7-8 | 100-200 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | |
| Dipsacus pilosus | Behaarte Karde | weiss | 6-8 | 100-150 | Humos, mager-nährstoffreich | ●● | 6.90 | |
| Draba aizoides | Immergrünes Felsenblümchen | gelb | 2-7 | 5-10 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| E | | | | | | | | |
| Echinacea purpurea | Purpur Sonnenhut; Igelkopf | purpur | 9-10 | 40-60 | Gewürz-/Heilpflanze | ○● | 6.90 | SG |
| Echium vulgare | Gemeiner Natterkopf | violettblau | 6-8 | 30-90 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | SG |
| Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen; Schmalblättriges Weidenröschen | purpurrosa | 6-8 | 50-150 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Epilobium dodonaei | Rosmarin-Weidenröschen | hellpurpur | 6-9 | 40-60 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | TG |
| Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | purpurrot | 6-9 | 50-100 | Wiese wechselfeucht | ○● | 6.90 | TG |
| Eupatorium cannabinum | Wasserdost | rosa | 7-9 | 50-150 | Wiese wechselfeucht | ○● | 7.90 | TG |
| Euphorbia amygdaloides | Mandelblättrige Wolfsmilch | grün-gelb | 4-6 | 30-60 | Gehölzrand | ●● | 7.90 | LU |
| Euphorbia cyparissias | Zypressenblättrige Wolfsmilch | gelb | 4-6 | 15-40 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Euphorbia dulcis | Süsse Wolfsmilch | grün-rötlich | 4-6 | 15-45 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | TG |
| F | | | | | | | | |
| Filipendula ulmaria | Mädesüss; Moor-Geissbart | weiss-rötlich | 6-8 | 90-150 | feucht | ○● | 7.90 | SG |
| Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüss; Knolliger Geissbart | weiss-rötlich | 5-7 | 30-80 | Ruderal; Gehölzrand | ○● | 7.90 | LU |
| Foeniculum vulgare | Gewürzfenchel | gelb | 7-9 | bis 200 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | SG |
| Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | weiss-rötlich | 4-6 | 5-20 | Gehölzrand | ○●● | 6.90 | TG |
| G | | | | | | | | |
| Galium album | Weisses Wiesen-Labkraut | weiss | 5-7; 9 | 30-90 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Galium odoratum | Echter Waldmeister | weiss | 4-5 | 10-30 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | |
| Galium verum | Echtes Labkraut; Gelbes Labkraut | goldgelb | 5-9 | 30-70 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Genista tinctoria | Färber-Ginster | gelb | 6-8 | 20-70 | Waldränder; trocken | ○● | 6.90 | |
| Geranium nodosum | Knotiger Storchschnabel | hellviolett | 5-10 | 20-50 | Gehölzrand; wechselfeucht | ●● | 6.90 | |
| Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | rotviolett | 6-10 | 40-80 | wechselfeucht | ○●● | 6.90 | LU |
| Geranium phaeum | Brauner Storchschnabel | schwarz-violett | 4-6; 9 | 30-70 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | TG |
| Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | blauviolett | 5-7 | 40-80 | Wiese fett | ○ | 6.90 | SG |
| Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | hellviolett | 5-10 | 20-60 | Wiese; Gehölzrand | ○● | 6.90 | TG |
| Geranium sanguineum | Blutroter Storchschnabel | purpurrot | 4-9 | 30-50 | Ruderal; Gehölzrand | ●● | 6.90 | TG |
| Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | rotviolett | 4-10 | 40-60 | Gehölzrand; trocken | ●● | 6.90 | LU |
| Gladiolus palustris | Sumpf-Gladiole | karminrot | 6 | 30-50 | Wechselfeucht | ○ | 9.10 | SG |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|-------------------------------|--|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | lachsrosa | 4-5 | 30-60 | Wechselfeucht | ●● | 6.90 | SG |
| Glechoma hederacea | Gundelrebe; Gundermann | blauviolett | 4-5 | 10-50 | Gehölzrand | ●●● | 6.90 | SG |
| Globularia bisnagarica | Gemeine Kugelblume | blauviolett | 4-6 | 10-20 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | TG |
| Globularia cordifolia | Herzblättrige Kugelblume | blauviolett | 5-7 | 3-10 | Ruderal | ○ | 6.90 | LU |
| Gypsophila repens | Kriechendes Gipskraut | weiss; hellrosa | 4-7 | 10-25 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| H | | | | | | | | |
| Hedera helix | Efeu | gelblich | 9-10 | bis 200 | Gehölzrand; Kletterpflanze | ●●● | ab 7.90 | SG |
| Helianthemum nummularium | Gemeines Sonnenröschen | gelb | 5-10 | 20-40 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | grüngelb | 2-4 | 30-60 | Gehölzrand; trocken | ●●● | 9.10 | SG |
| Helleborus niger | Christrose; Schneerose | weiss | 1-3 | 15-30 | Gehölzrand; trocken | ●●● | 9.10 | |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | blau-lila | 3-5 | 5-15 | Gehölzrand; trocken | ●● | 7.90 | SG |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | weiss | 6-7 | 80-150 | Wiese fett | ●● | 6.90 | |
| Hesperis matronalis | Gemeine Nachtsviole | lila; weiss | 5-6 | 60-100 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | LU |
| Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | orangerot | 5-9 | 30-60 | Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Hieracium murorum; sylvaticum | Wald-Habichtskraut | gelb | 5-9 | 30-70 | Gehölzrand; trocken | ●● | 6.90 | LU |
| Hieracium pilosella | Langhaariges Habichtskraut | zitronengelb | 5-10 | 10-20 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Hieracium umbellatum | Doldiges Habichtskraut | gelb | 8-10 | 30-120 | Ruderal; Wiese mager | ● | 6.90 | LU |
| Hippocrepis comosa | Schopfiger Hufeisenklee | gelb | 5-6 | 10-20 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Hippocrepis emerus | Strauchwicke | gelb | 4-6 | 50-200 | Ruderal | ●● | 6.90 | |
| Humulus lupulus | Hopfen | grün | 7-8 | 300-600 | Gehölzrand | ●●● | ab 9.00 | SG |
| Hyoscyamus niger | Schwarzes Bilsenkraut | trübgelb | 6-9 | 20-60 | Ruderal; Wiese fett | ○ | 6.90 | TG |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | gelb | 6-9 | 40-70 | Ruderal; Wiese mager/fett | ●● | 6.90 | BE |
| Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | gelb | 7-9 | 40-70 | humos, trischfeucht/wechselfeucht | ● | 6.90 | |
| Hypochaeris radicata | Wiesen-Ferkelkraut | gelb | 6-10 | 20-60 | Wiese fett | ●● | 6.90 | SG |
| Hyssopus officinalis | Echter Ysop | blau | 7-9 | 20-60 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| I | | | | | | | | |
| Inula helenium | Echter Alant | gelb | 7-8 | 60-200 | Ruderal; trocken | ●● | 7.90 | TG |
| Inula salicina | Weiden-Alant | gelb | 7-8 | 40-70 | Wechselfeucht | ●● | 6.90 | SG |
| Iris sibirica | Sibirische Schwertlilie; Sumpfschwertlilie | violettblau | 5-6 | 50-80 | Wechselfeucht | ○ | 7.90 | SG |
| Isatis tinctoria | Färber-Waid | gelb | 4-5 | 50-120 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| K | | | | | | | | |
| Knautia arvensis | Feld-Witwenblume | lila | 5-6; 9-10 | 50-90 | Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | SG |
| Knautia dipsacifolia | Wald-Witwenblume | lila | 6-10 | 60-120 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | LU |
| L | | | | | | | | |
| Lamium album | Weisse Taubnessel | weiss | 4-10 | 30-60 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | LU |
| Lamium galeobdolon | Goldnessel | gelb | 4-9 | 20-50 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | purpur | 3-10 | 20-50 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | LU |
| Laserpitium siler | Berg-Laserkraut | weiss | 5-7 | 60-120 | Ruderal | ○ | 7.90 | LU |
| Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse | altrosa | 6-8 | 100-200 | Ruderal fett | ●● | 7.90 | TG |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | gelb | 6-9 | 40-90 | Wiese fett/mager | ●● | 6.90 | D |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|-------------------------|--|--------------|------------|---------|------------------------------|-------|----------|----------|
| Lathyrus sylvestris | Wald-Platterbse | rosa | 6-9 | 100-200 | Gehölzrand | ○● | 7.90 | TG |
| Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | rot-blau | 4-5 | 20-40 | Gehölzrand | ○●● | 6.90 | SG |
| Lavandula angustifolia | Lavendel | lavendelblau | 7-8 | 30-70 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Leontodon hispidus | Raues Milchkraut; Herbstlöwenzahn | gelb | 5-10 | 30-50 | Wiese mager | ○ | 6.90 | LU |
| Leontopodium alpinum | Edelweiss | weiss | 7-9 | 5-20 | Ruderal | ○ | 7.90 | BE |
| Leonurus cardiaca | Löwenschweif; Löwenschwanz; Herzgespann | altrosa | 7-9 | 70-120 | Ruderal; Wiese fett | ○ | 6.90 | SG |
| Leucanthemum vulgare | Wiesen-Margerite | weiss | 5-10 | 40-80 | Wiese fett/mager | ○● | 6.90 | BE |
| Levisticum officinale | Liebstockel | gelb | 7-8 | bis 200 | Gewürzpflanze | ● | 6.90 | TG |
| Lilium martagon | Türkenbund | hellpurpur | 6-7 | 30-90 | Gehölzrand | ●● | ab 21.00 | SG |
| Linaria vulgaris | Gemeines Leinkraut; Frauenflachs | gelb; orange | 6-10 | 30-60 | Ruderal | ○● | 6.90 | SG |
| Linum perenne | Ausdauernder Lein; Stauden-Lein | blau | 5-7 | 20-50 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |
| Lithospermum officinale | Echter Steinsame | weisslich | 5-6 | 30-80 | Gehölzrand | ● | 6.90 | SG |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | gelb-rötlich | 4-9 | 20-30 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Lotus maritimus | Gelbe Spargelerbse | hellgelb | 5-7 | 10-30 | mässig; trocken- feucht | ○● | 6.90 | TG |
| Lunaria annua | Garten-Mondviole | lila | 4-5 | 50-90 | Waldränder; trocken | ●● | 6.90 | GR |
| Lunaria rediviva | Wilde Mondviole | helllila | 4-5 | 50-120 | Gehölzrand | ●● | 7.90 | BE |
| Lycopus europaeus | Europäischer Wolfssuss; Wolfstrapp | weiss | 7-9 | 30-90 | wechselfeucht | ● | 7.90 | LU |
| Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | gelb | 6-7 | 40-50 | wechselfeucht | ○●● | 6.90 | SG |
| Lysimachia vulgaris | Gemeiner Gilbweiderich | gelb | 6-8 | 60-120 | wechselfeucht | ○● | 7.90 | SG |
| Lythrum salicaria | Blut-Weiderich | karmin | 6-9 | 70-120 | wechselfeucht | ○● | 6.90 | SG |
| M | | | | | | | | |
| Maianthemum bifolium | Zweiblättrige Schattenblume | weiss | 5 | 5-20 | Gehölzrand | ● | 6.90 | TG |
| Malva alcea | Sigmarswurz; Rosenmalve | rosa | 7-9 | 80-120 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Malva moschata | Moschus-Malve; Bisam-Malve | rosa; weiss | 6-9 | 50-80 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | SG |
| Malva sylvestris | Wilde Malve | rotviolett | 6-10 | 70-120 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Marrubium vulgare | Gemeiner Andorn | weisslich | 6-7 | 30-50 | Ruderal; Wiese fett | ○ | 6.90 | SG |
| Medicago sativa | Saat-Luzerne | blauviolett | 7-9 | 50-90 | Wiese | ○● | 7.90 | SG |
| Melilotus albus | Weisser Honigklee; Weisser Steinklee | weiss | 6-9 | 50-150 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Melilotus officinalis | Echter Honigklee; Echter Steinklee | gelb | 6-9 | 50-150 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Melissa officinalis | Zitronenmelisse | weiss | 7-10 | 80-100 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | SG |
| Melittis melissophyllum | Immenblatt | rosa; weiss | 5-6 | 30-50 | Gehölzrand | ○● | 9.10 | TG |
| Mentha longifolia | Ross-Minze | lila | 7-9 | 60-100 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | SG |
| Mentha piperita | Pfefferminze | lila | 6-8 | 40-100 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | BE |
| Mentha spicata | Grüne Minze | violett | 7-9 | 50-60 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | TG |
| Monarda didyma | Goldmelisse | rot | 6-9 | 70-100 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | BE |
| Mondarda fistulosa | Wilde Bergamotte | rosa | 7-8 | 70-100 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | SG |
| Muscari botryoides | Kleine Traubenhyazinthe | hellblau | 3-4 | 20-30 | Zwiebelpflanze | ○● | 6.90 | SG |
| Myrrhis odorata | Süssdolde | weiss | 4-5 | 60-150 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○●● | 7.90 | SG |
| N | | | | | | | | |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|--------|---------------------------------|-------|----------|----------|
| Nepeta cataria | Echte Katzenminze | gelblich; rosa | 7-8 | 50-100 | Ruderal; Wiese fett | ☉ | 6.90 | BE |
| O | | | | | | | | |
| Onobrychis vicifolia | Saat-Esparsette | rosa | 5-9 | 50-80 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Ononis repens | Kriechende Hauhechel | rosa | 6-8 | 30-50 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 7.90 | LU |
| Ononis spinosa | Dornige Hauhechel | rosa | 6-9 | 40-70 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 7.90 | SG |
| Onopordum acanthium | Eselsdistel | purpur | 6-8 | 50-150 | Ruderal; Wiese fett | ○ | 7.90 | TG |
| Origanum rotundifolium | Hopfen Oregano | rosa | 6-8 | 15-30 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Origanum vulgare | Echter Dost; Wilder Majoran | hellrosa; purpur | 7-10 | 30-70 | Ruderal; Wiese mager/fett | ☉ | 6.90 | SG |
| Ornithogalum caudatum | Falsche Meerzwiebel; Geschwänzter Milchstern | weiss | 6-8 | 50-70 | Gewürzpflanze; nicht winterhart | ○ | 7.90 | BE |
| Ornithogalum umbellatum | Doldiger Milchstern | weiss | 4-5 | 20-30 | Wiese fett | ☉ | 6.90 | BE |
| P | | | | | | | | |
| Paeonia officinalis | Pfingstrose | purpur | 5-6 | 60-80 | Gehölzrand | ☉ | ab 11.00 | TG |
| Paris quadrifolia | Vierblättrige Einbeere | grünlich | 4-5 | 10-30 | Gehölzrand | ☉ | 11.00 | TG |
| Pastinaca sativa | Pastinak | gelb | 7-8 | 60-150 | Ruderal; Wiese mager/fett | ☉ | 6.90 | TG |
| Perovskia abrotanoides | Silberbusch; Blauroute | hellviolett | 8-9 | 50-150 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |
| Petasites albus | Weisse Pestwurz | weiss | 3-4 | 15-60 | Wiese fett; Gehölzrand | ☉ | 7.90 | SG |
| Petrorhagia saxifraga | Steinbrech-Felsennelke | helllila; rosa | 6-10 | 10-25 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Peucedanum austriacum ssp. rablense | Raibler Haarstrang | weiss | 7-9 | 60-100 | Ruderal/Wiese mager | ☉ | 7.90 | LU |
| Peucedanum cervaria | Hirschwurz | weiss | 7-9 | 60-100 | Wiese fett; Gehölzrand | ☉ | 7.90 | LU |
| Peucedanum ostruthium | Meisterwurz | weiss | 5-6 | 50-100 | Wiese fett; Gehölzrand | ☉ | 7.90 | |
| Peucedanum palustre | Sumpf-haarstrang | weiss | 7-9 | 80-150 | wechselfeucht | ☉ | 7.90 | SG |
| Phyteuma orbiculare | Rundköpfige Rapunzel; Teufelskralle | blauviolett | 4-5 | 10-30 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 7.90 | SG |
| Phyteuma spicatum | Ährige Rapunzel | weiss | 4-6 | 30-70 | Gehölzrand | ☉ | 7.90 | D |
| Pimpinella major | Grosse Bibernelle | weiss | 6-9 | 50-90 | Wiese fett | ☉ | 6.90 | LU |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | weiss | 7-10 | 30-60 | Ruderal; Wiese mager | ☉ | 6.90 | BE |
| Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | weiss | 4-9 | 10-40 | Wiese; Wegränder | ☉ | 6.90 | SG |
| Plantago major | Breit-Wegerich | grün | 5-10 | 20-30 | Ruderal; trocken | ○ | 6.90 | SG |
| Plantago media | Millterer Wegerich | weiss | 5-9 | 20-40 | trocken, ruderal, humos | ○ | 6.90 | |
| Polemonium caeruleum | Himmelsleiter; Jakobsleiter; Sperrkraut | blau | 5-6 | 60-90 | Gehölzrand | ☉ | 6.90 | LU |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütiges Salomonssiegel | weiss | 4-5 | 40-70 | Gehölzrand | ☉ | 7.90 | TG |
| Polygonatum odoratum | Echtes Salomonssiegel | weiss | 5-6 | 20-40 | Gehölzrand | ☉ | 7.90 | |
| Polygonatum verticillatum | Quirlblättriges Salomonssiegel | weiss | 5 | 40-100 | Gehölzrand | ☉ | 7.90 | |
| Polypodium bistorta | Schlangen-Knöterich | rosa | 4-9 | 60-80 | frisch, humos-lehmig | ☉ | 6.90 | |
| Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut | gelb | 5-7 | 10-15 | Ruderal | ☉ | 6.90 | BE |
| Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | gelb | 5-6 | 20-40 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | LU |
| Potentilla erecta | Blutwurz; Tormentill | gelb | 4-10 | 10-30 | Wiese | ☉ | 6.90 | BE |
| Potentilla recta | Hohes Fingerkraut | hellgelb | 6-10 | 30-70 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |
| Potentilla verna (neumanniana) | Frühlings-Fingerkraut | gelb | 3-5; 7-10 | 5-30 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Primula elatior | Wald-Schlüsselblume; Hohe Schlüsselblume | hellgelb | 2-4 | 10-25 | Gehölzrand | ☉ | 6.90 | LU |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|---------------------------------|--|--------------|------------|--------|---------------------------|-------|-------|----------|
| Primula veris | Frühlings-Schlüsselblume | gelb | 3-4 | 10-25 | Wiese mager | ○ | 6.90 | BE |
| Prunella grandiflora | Grosse Braunelle | blauviolett | 6-10 | 10-40 | Wiese mager | ○ | 6.90 | TG |
| Prunella vulgaris | Kleine Braunelle | blauviolett | 6-10 | 10-25 | Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Pulicaria dysenterica | Grosses Flohkraut | gelb | 7-9 | 40-70 | Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut; Geflecktes Lungenkraut | violett-rot | 3-5 | 15-30 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | |
| Pulsatilla vulgaris | Gemeine Kuhschelle; Küchenschelle | violett | 3-4 | 10-20 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | TG |
| R | | | | | | | | |
| Reseda lutea | Gelbe Reseda; Gelber Wau | hellgelb | 5-9 | 30-60 | Ruderal mager/fett | ○ | 6.90 | BE |
| Reseda luteola | Färber-Reseda; Färber-Wau | blassgelb | 5-8 | 80-150 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Rosmarinus officinalis | Rosmarin | lila | 3-5 | 30-100 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |
| Rumex sanguineus | Blut-Ampfer | grün; rot | 4-8 | 50-80 | Gewürzpflanze | ○● | 6.90 | TG |
| Ruta graveolens | Wein-Raute | zitronengelb | 6-8 | 40-70 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | SG |
| S | | | | | | | | |
| Salvia glutinosa | Klebriger Salbei | hellgelb | 7-10 | 50-100 | Gehölzrand | ●● | 7.90 | SG |
| Salvia lavandulifolia | Spanischer Salbei | blau | 6-7 | 30-60 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | |
| Salvia officinalis | Echte Salbei; Garten-Salbei | blau | 6-8 | 40-80 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | dunkelblau | 4-5; 7-9 | 60-100 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Salvia sclarea | Muskatellersalbei | lila | 6-7 | 40-80 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |
| Salvia verticillata | Quirlige Salbei | hellviolett | 5-10 | 30-60 | Ruderal; Wiese fett/mager | ○ | 6.90 | TG |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | grün-rötlich | 4-6; 8 | 30-50 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Sanguisorba officinalis | Grosser Wiesenknopf | dunkelrot | 6-9 | 60-100 | Wiese wechselfeucht | ○● | 6.90 | LU |
| Saponaria ocyroides | Rotes Seifenkraut | dunkelrosa | 4-6 | 10-20 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | weiss-rosa | 7-9 | 40-80 | Ruderal; mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Satureja montana | Winter-Bohnenkraut | weiss | 8-10 | 20-30 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Satureja montana var. citridora | Zitronen-Berg-Bohnenkraut | weiss-rosa | 8-9 | 20-30 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Satureja repandra | Kriechendes Bohnenkraut | weiss | 7-10 | 10-20 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Saxifraga cotyledon | Strauss-Steinbrech | weiss | 5-6 | 20-50 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Saxifraga paniculata | Trauben-Steinbrech | weiss | 5 | 10-30 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |
| Saxifraga rotundifolia | Rundblättriger Steinbrech | weiss | 4-6 | 20-50 | Gehölzrand; frischfeucht | ●● | 6.90 | TG |
| Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | lila | 5-10 | 30-70 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | rotbraun | 5-9 | 60-100 | Gehölzrand | ● | 6.90 | BE |
| Securigera varia | Bunte Kronwicke | rosa/weiss | 6-10 | 50-100 | Mager | ○● | 6.90 | SG |
| Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | gelb | 6-7 | 5-15 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Sedum album | Weisser Mauerpfeffer | weiss | 7-8 | 10-30 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Sedum dasyphyllum | Dickblättriger Mauerpfeffer | weiss | 5-7 | 5-15 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Sedum rupestre (reflexum) | Felsen-Mauerpfeffer | gelb | 6-8 | 15-30 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | gelb | 6-7 | 5-15 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Sedum telephium | Riesen-Fettkraut | karminrot | 7-9 | 30-70 | Ruderal | ○ | 6.90 | |
| Sedum telephium ssp. maximum | Gewöhnliches Riesen-Fettkraut | grünlichgelb | 7-9 | 30-70 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------------------------------|-------|-------|----------|
| Sempervivum arachnoideum | Spinnweb-Hauswurz | karminrot | 6-7 | 10-15 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |
| Sempervivum tectorum | Dach-Hauswurz | hellrot | 7-8 | 20-40 | Ruderal | ○ | 6.90 | SG |
| Serratula tinctoria | Färber-Scharte | purpur | 7-9 | 60-100 | Gehölzrand; wechselfeucht | ○● | 7.90 | LU |
| Seseli libanotis | Hirschheil | weiss | 6-9 | 60-100 | Ruderal; Gehölzrand mager | ○● | 7.90 | TG |
| Silaum silaus | Wiesensilge; Rosskümmel | gelbgrün | 7-10 | 50-100 | wechselfeucht | ○● | 6.90 | SG |
| Silene dioica | Rote Waldnelke; Rote Lichtnelke | karminrot | 4-5 | 40-80 | Gehölzrand; Wiese fett | ○●● | 6.90 | SG |
| Silene flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | rosa | 4-6; 9 | 40-80 | Wiese wechselfeucht | ○● | 6.90 | LU |
| Silene flos-jovis | Jupiter-Lichtnelke | dunkelrosa | 5 | 40-60 | Ruderal | ○ | 6.90 | |
| Silene nutans | Nickendes Leimkraut | weisslich | 5-6 | 30-60 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Silene pratensis | Weisse Lichtnelke | weiss | 6-9 | 60-80 | Wiese fett | ○● | 6.90 | SG |
| Silene viscaria | Gemeine Pechnelke | rosa | 5-6 | 30-60 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | TG |
| Silene vulgaris | Aufgeblasenes Leimkraut | weisslich | 5-9 | 30-50 | Ruderal/Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Silybum marianum | Mariendistel | purpur | 6-9 | 80-150 | Ruderal; Wiese fett | ○ | 7.90 | SG |
| Sium sisarum | Zuckerwurzel | weiss | 7-9 | 40-80 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |
| Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | violett | 6-8 | 30-200 | Gehölzrand | ● | 7.90 | SG |
| Solidago virgaurea | Echte Goldrute | gelb | 7-9 | 50-100 | Gehölzrand; trocken | ○●● | 6.90 | SG |
| Stachys officinalis | Echte Betonie; Heil-Ziest | rosa-purpur | 6-9 | 40-70 | Gehölzrand; Wiese | ○● | 6.90 | SG |
| Stachys palustris | Sumpf-Ziest | purpur | 6-9 | 30-100 | Wiese; feucht | ○● | 6.90 | TG |
| Stachys recta | Aufrechter Ziest | weiss; hellgelb | 5-10 | 30-60 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Stachys sylvatica | Wald-Ziest | purpur | 6-8 | 50-80 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | BE |
| Succisa pratensis | Teufelsabbiss; Abbisskraut | blauviolett | 7-9 | 60-100 | wechselfeucht | ○● | 7.90 | LU |
| Symphytum officinale | Echte Wallwurz; Beinwell | purpurviolett | 5-8 | 40-120 | Gewürzpflanze | ● | 6.90 | SG |
| T | | | | | | | | |
| Tanacetum corymbosum | Straussblütige Margerite | weiss | 6-7 | 60-100 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Tanacetum balsamita | Marienblatt; Balsamkraut; Frauenminze | weiss-gelb | 8-10 | 50-150 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |
| Tanacetum parthenium | Mutterkraut | weiss | 6-8 | 30-60 | Wiese mager | ○● | 6.90 | TG |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | gelb | 7-9 | 70-120 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Teucrium botrys | Trauben-Gamander | rosa-weiss | 6-9 | 10-15 | trocken; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | rosa | 6-8 | 15-25 | Gehölzrand; Wiese mager | ○● | 6.90 | SG |
| Teucrium montanum | Berg-Gamander | hellgelb | 5-7; 9 | 5-15 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Teucrium scorodonia | Salbeiblättriger Gamander | hellgelb | 6-8 | 30-60 | Gehölzrand; trocken | ●● | 6.90 | SG |
| Thalictrum aquilegifolium | Akeleiblättrige Wiesenraute | lila; weiss | 5-6 | 70-120 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | SG |
| Thalictrum flava | Gelbe Wiesenraute | gelb | 6-8 | 100-120 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Thalictrum minus | Kleine Wiesenraute | gelblich | 5-6 | 50-100 | Gehölzrand; Wiese mager | ○● | 6.90 | LU |
| Thymus citriodorus | Zitronen-Thymian | lila | 6-7 | 15-30 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Thymus herba-barona citriodora | Kümmel/Zitronen Thymian | rosa | 6-7 | 20-30 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Thymus longicaulis ssp. odoratus | Kaskaden Thymian | rosa | 6-7 | 5-15 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | BE |
| Thymus pulegioides | Arznei-Feld-Thymian; Quendel | rosa-purpur | 5-10 | 5-15 | Ruderal; Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Thymus vulgaris | Gewürz-Thymian; Garten-Thymian | lila | 6-7 | 10-25 | Gewürzpflanze | ○ | 6.90 | TG |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|
| Tragopogon dubius | Grosser Bocksbart | hellgelb | 5-8 | 40-80 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | LU |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart; Habermarch | gelb | 5-7 | 50-80 | Wiese fett | ○ | 6.90 | SG |
| Trifolium arvense | Hasen-Klee | rötlich-weiss | 6-8 | 10-40 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | |
| Trifolium montanum | Berg-Klee | weiss | 5-6 | 15-40 | Wiese mager | ○● | 6.90 | |
| Trollius europaeus | Europäische Trollblume | gelb | 4-5; 9 | 40-60 | wechselfeucht | ○● | 6.90 | LU/BE |
| Tussilago farfara | Huflattich | gelb | 2-3 | 5-30 | Mager; Trockenrasen | ○ | 6.90 | SG |
| U | | | | | | | | |
| Urtica dioica | Grosse Brennessel | grünlich | 6-9 | 60-100 | Schuttplätze; Gebüsch | ○● | 6.90 | SG |
| V | | | | | | | | |
| Valeriana dioica | Sumpfbaldrian | rosa-weiss | 4-5 | 15-30 | SZ | ○● | 6.90 | SG |
| Valeriana officinalis | Arznei-Baldrian | rosa-weiss | 5-8 | 40-150 | Gehölzrand; wechselfeucht | ● | 6.90 | SG |
| Valeriana tripteris | Dreiblatt-Baldrian | weiss | 4-7 | 20-50 | Gehölzrand | ○●● | 6.90 | SG |
| Veratrum album | Weisser Germer; Gemeiner Germer | grünlich-weiss | 7 | 60-150 | Nährstoffreiche Böden, wechselfeucht | ○● | 7.90 | SG |
| Verbascum blattaria | Schabenkraut; Mottenkönigskerze | gelb; violett | 6-8 | 30-120 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | LU |
| Verbascum densiflorum | Grossblütige Königskerze | gelb | 6-9 | 50-150 | Ruderal mager | ○ | 6.90 | LU |
| Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze | weiss | 6-9 | 90-150 | ruderal, trocken | ○● | 6.90 | |
| Verbascum nigrum | Dunkle Königskerze | gelb | 6-8 | 70-100 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | SG |
| Verbascum phoeniceum | Violette Königskerze | violett | 6-9 | 30-100 | Ruderal; trocken | ○ | 6.90 | |
| Verbena officinalis | Eisenkraut | blasslila | 6-9 | 30-70 | Ruderal; Wiese mager/fett | ○● | 6.90 | SG |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | blau | 4-5 | 10-30 | Wiese fett | ○● | 6.90 | LU |
| Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis; Wald-Ehrenpreis | blassblau | 5-6 | 10-20 | Gehölzrand | ● | 6.90 | SG |
| Veronica spicata | Ähriger Ehrenpreis | violettblau | 7-9 | 10-35 | Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | TG |
| Veronica teucrium | Grosser Ehrenpreis | blau | 5-6 | 20-40 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | blau; rotviolett | 4-5; 9-10 | 10-25 | Gehölzrand; Ruderal mager | ○●● | 6.90 | |
| Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz | weiss | 5-10 | 50-100 | Gehölzrand; Ruderal mager | ○● | 9.10 | SG |
| Viola odorata | Wohlriechendes Veilchen | dunkelviolett | 3-4 | 5-15 | Gehölzrand | ● | 6.90 | LU |
| Viola reichenbachiana | Wald-Veilchen | hellviolett | 3-5 | 5-20 | Gehölzrand; Schattenlage | ●● | 6.90 | LU |
| Viola tricolor | Feld-Stiefmütterchen | violett; gelb | 4-10 | 10-20 | Wiese mager/fett | ○ | 6.90 | BE |
| Sumpf- & Wasserpflanzen | | SZ = Sumpfbzone (0-5 cm) | | FZ = Flachwasserzone (5-40 cm) | | TZ = Tiefwasserzone (ab 40cm) | | |
| Acorus calamus | Kalmus | grünlich | 6 | 60-100 | SZ / FZ | ○ | 9.10 | TG |
| Alisma plantago-aquatica | Gemeiner Froschlöffel | weiss | 6-9 | 40-100 | SZ / FZ | ○ | 9.10 | TG |
| Berula erecta | Kleiner Merk; Wassersellerie | weiss | 6-7 | 80-120 | SZ / FZ | ● | 9.10 | |
| Butomus umbellatus | Schwanenblume; Blumenbinse | hellrosa | 6-7 | 60-150 | SZ / FZ | ● | 9.10 | |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | goldgelb | 3-5; 8 | 20-50 | SZ | ● | 7.90 | TG |
| Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | gelb | 3-4 | 5-20 | SZ | ●● | 6.90 | |
| Equisetum hyemale | Winter-Schachtelhalm | grün | 5-6 | 60-80 | SZ | ○● | 9.10 | |
| Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | weiss | 4-6 | 20-50 | SZ | ○ | 9.10 | SG |
| Eriophorum latifolium | Breitblättriges Wollgras | weiss | 4-5 | 20-50 | SZ | ○● | 7.90 | SG |
| Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | gelb | 5-6 | 50-150 | SZ | ○● | 7.90 | |
| Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | lachsrosa | 4-5 | 30-60 | SZ / FZ | ●● | 6.90 | SG |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|--|--|--------------|------------|---------|--------------------|-------|----------|----------|
| Hippuris vulgaris | Tannenwedel | grünlich | 5-8 | 20-80 | FZ / TZ | ○● | 7.90 | |
| Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiss | weiss | 6-8 | | FZ / TZ | ● | 9.10 | |
| Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie; Wasser-Schwertlilie | gelb | 5-6 | 60-100 | SZ / FZ | ○● | 7.90 | BE |
| Iris sibirica | Sibirische Schwertlilie; Sumpf-Schwertlilie | violettblau | 5-6 | 50-80 | SZ | ○ | 7.90 | SG |
| Juncus effusus | Flatter-Binse | gelbbraun | 7-8 | 30-100 | SZ | ○● | 6.90 | TG |
| Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | braun | 6-8 | 30-70 | SZ | ○● | 6.90 | TG |
| Lysimachia thyrsiflora | Strauss-Gilbweiderich | gelb | 5-6 | 40-70 | SZ / FZ | ○● | 9.10 | |
| Lysimachia vulgaris | Gemeiner Gilbweiderich | gelb | 6-8 | 60-120 | SZ | ○● | 9.10 | SG |
| Mentha aquatica | Wasser-Minze | rosa | 7-9 | 30-60 | SZ | ● | 6.90 | SG |
| Menyanthes trifoliata | Fieberklee | weiss | 4-5 | 15-30 | SZ / FZ | ○ | 9.10 | |
| Myosotis scorpioides | Sumpf-Vergissmeinnicht | hellblau | 5-9 | 20-50 | SZ | ● | 9.10 | |
| Myriophyllum spicatum | Ähriges Tausendblatt | rötlich | 5 | | TZ | ○ | 6.90 | |
| Nuphar lutea | Grosse Teichrose | gelb | 6-7 | 15-30 | TZ | ○ | ab 43.00 | SG |
| Nymphaea alba | Weisse Seerose | weiss | 6-8 | | TZ | ○ | ab 43.00 | SG |
| Potamogeton nodosus | Flutendes Laichkraut; Knoten-Laichkraut; Schwimmendes Laichkraut | bräunlich | 7 | | FZ / TZ | ○ | 9.10 | |
| Potentilla palustris | Blutauge | dunkelpurpur | 5-6 | 30-70 | FZ / TZ | ○● | 7.90 | |
| Ranunculus aquatica | Gemeiner Wasserhahnenfuss | weiss | 5-9 | | FZ / TZ | ○ | 9.10 | |
| Ranunculus flammula | Kleiner Sumpf-Hahnenfuss | gelb | 5-8 | 10-30 | SZ | ○● | 6.90 | |
| Ranunculus lingua | Grosser Sumpf-Hahnenfuss; Zungen-Hahnenfuss | gelb | 5-7 | 50-150 | SZ / FZ | ○ | 6.90 | |
| Sagittaria sagittifolia | Gemeines Pfeilkraut | weiss | 7-8 | 50-100 | SZ / FZ | ● | 9.10 | |
| Schoenoplectus lacustris | See-Flechtbinse | bräunlich | 6-7 | 100-300 | SZ / FZ / TZ | ○ | 9.10 | |
| Scrophularia umbrosa | Geflügelte Braunwurz | rotbraun | 6-8 | 60-120 | SZ | ○● | 6.90 | |
| Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut | violettblau | 6-8 | 30-60 | SZ | ● | 6.90 | |
| Sparganium erectum | Ästiger Igelkolben | weisslich | 5-6 | 80-120 | SZ / FZ | ○● | 9.10 | |
| Stachys palustris | Sumpf-Ziest | rosa-purpur | 6-8 | 60-100 | SZ | ● | 6.90 | TG |
| Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben | braun | 6-7 | 100-250 | SZ / FZ / TZ | ○ | 9.10 | |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | dunkelbraun | 6-7 | 100-250 | SZ / FZ / TZ | ○ | 9.10 | SG |
| Typha minima | Zwerg-Rohrkolben | dunkelbraun | 5 | 40-80 | SZ / FZ | ○ | 9.10 | |
| Utricularia australis | Südlicher Wasserschlauch; Verkannter Wasserschlauch | gelb | 6-8 | | FZ / TZ | ○ | 9.10 | |
| Valeriana dioica | Sumpf-Baldrian | rosa-weiss | 4-5 | 15-30 | SZ | ○● | 6.90 | SG |
| Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis; Bachbunge | blau | 5-7 | 20-50 | SZ | ○ | 6.90 | D |
| Farne (aus konventionellem Anbau) | | | | | | | | |
| Asplenium trichomanes | Braunstielliger Streifenfarn | wintergrün | | 5-20 | Gehölzrand; Mauern | ○● | 8.10 | |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | | | 70-120 | Gehölzrand | ○● | 8.10 | |
| Dryopteris affinis | Schuppiger Wurmfarne | | | 40-90 | Gehölzrand | ○● | 8.10 | |
| Dryopteris dilatata | Breiter Wurmfarne | | | 70-150 | Gehölzrand | ○● | 8.10 | |
| Dryopteris filix-mas | Echter Wurmfarne | | | 70-120 | Gehölzrand | ○● | 8.10 | |
| Matteuccia struthiopteris | Straussfarne | | | 30-120 | Gehölzrand | ● | 8.10 | |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Blütenzeit | Höhe | Standort | Licht | Preis | Herkunft |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|-------|-------|----------|
| Phyllitis scolopendrium | Hirschzunge | wintergrün | | 20-60 | Gehölzrand | ●● | 8.10 | |
| Polypodium vulgare | Gemeiner Tüpfelfarn | | | 10-20 | Gehölzrand | ● | 8.10 | |
| Polystichum aculeatum | Gelappter Schildfarn | wintergrün | | 40-70 | Gehölzrand | ●● | 8.10 | |
| Polystichum setiferum | Borstiger Schildfarn | wintergrün | | 40-70 | Gehölzrand | ●● | 8.10 | |
| Thelypteris palustris | Sumpffarn | | | 30-70 | Wechselfeucht | ● | 8.10 | |
| Gräser | | | | | | | | |
| Achnatherum calamagrostis | Raugras | gelblich | 6-7 | 60-120 | Ruderal mager | ○ | 7.90 | |
| Briza media | Mittleres Zittergras | grünlich | 5-6 | 20-50 | Wiese mager | ○ | 6.90 | SG |
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | bräunlich | 7-8 | 60-150 | Waldlichtungen; Ufer | ●● | 6.90 | SG |
| Carex digitata | Finger-Segge | gelb-rotbraun | 4 | 20-30 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | |
| Carex sylvatica | Wald-Segge | braun | 5-6 | 30-70 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | gelblich | 6-8 | 30-120 | Gehölzrand | ○● | 6.90 | LU |
| Festuca ovina | Schaf-Schwingel | gelblich | 5-7 | 20-40 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |
| Luzula campestris | Feld-Hainsimse | gelblich | 3-4 | 5-15 | Wiese mager | ●● | 6.90 | |
| Luzula luzuloides | Weissliche Hainsimse | weisslich | 6-7 | 30-70 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Luzula nivea | Schneeweisse Hainsimse | weiss | 6-7 | 30-70 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Luzula sylvatica | Wald-Hainsimse | braun | 5-6 | 30-100 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | SG |
| Melica ciliata | Wimper-Perlgras | gelblich | 5-6 | 30-70 | Ruderal mager | ○● | 6.90 | SG |
| Melica nutans | Nickendes Perlgras | grünlich | 4-5 | 30-50 | Gehölzrand | ●● | 6.90 | LU |
| Molinia arundinacea | Rohr-Pfeifengras; Hohes Pfeifengras | grünlich | 7-9 | 120-150 | Ruderal; Wiese mager | ○● | 6.90 | LU |
| Molinia caerulea | Blaues Pfeifengras | grünlich | 7-9 | 30-100 | wechselfeucht, Gehölzrand | ○● | 6.90 | TG |
| Sesleria caerulea | Kalk-Blaugras; Gewöhnliches Blaugras | bläulich | 3-6 | 20-50 | Ruderal | ○ | 6.90 | TG |